

مقایسه تاثیر دو سیستم Xp-endo-Shaper و One-Shape بر میزان دبری خروجی - مطالعه آزمایشگاهی

دکتر سهراب طور سواد کوهی^۱ دکتر احسان اثنا عشری^۱ دکتر افسانه شاهزادی^۲ دکتر مهتا فضل یاب^۱ دکتر امیر عباس مشاری^{۱*}
۱- استادیار بخش اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی واحد دندانپزشکی تهران، تهران، ایران
۲- دندانپزشک

خلاصه:

سابقه و هدف: خروج دبری از اپکس از عوامل بروز flare (تورم، درد یا ترکیبی از هر دو) می‌باشد. تحقیقات مختلفی در رابطه با میزان خروج دبری در سیستم‌ها و فایل‌های مختلف صورت گرفته است، ولی تحقیقی در مورد مقایسه دو سیستم Xp-endo-Shaper و One-Shape در کanal‌های خمیده گزارش نشده است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان خروج دبری از فورامن اپیکال به دنبال آماده‌سازی با دو سیستم چرخشی One-Shape و Xp-endo-Shaper در کanal‌های خمیده مزیو باکال مولرهای اول فک پایین انجام شد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه با روش تجربی-آزمایشگاهی روی ۳۴ دندان مولر اول فک پایین واجد شرایط با کanal‌های مزیو باکال با خمیدگی ۳۰ تا ۴۰ درجه که به طور تصادفی به ۲ گروه تقسیم شدند انجام شد، در یک گروه از فایل‌های سیستم چرخشی- One-Shape و در گروه دوم از سیستم Xp-endo-Shaper برای اماده سازی کanal‌ها استفاده شد. ریشه دندان‌ها تا ناحیه سروکال در وبالهای شیشه‌ای که قبل از وزن شده بودند قرار گرفتند بطوریکه دبری‌های خارج شده از فورامن اپیکال در ویالها جمع شده و پس از مرحل خشک نمودن دوباره وزن وبالهای اندازه گیری شد. تفاوت وزن اولیه ویالها با وزن ثانویه حاوی دبری به عنوان وزن دبری خارج شده در نظر گرفته شد، یافته‌ها توسط آزمون T-test آنالیز آماری شدند.

یافته‌ها: میزان خروج دبری در سیستم One-Shape برابر 0.18 ± 0.01 در سیستم Xp-endo-Shaper برابر 0.07 ± 0.01 بود که اختلاف از لحاظ آماری معنی دار است. ($P=0.01$)

نتیجه گیری: با توجه به شرایط و محدودیت‌های این تحقیق که سیستم چرخشی Xp-endo-Shaper میزان خروج اپیکالی دبری کمتری را نسبت به سیستم چرخشی One-Shape دارد.

کلمات کلیدی: دبری خارج شده، Xp-endo-Shaper، One-Shape، حرکت چرخشی کامل

پذیرش مقاله: ۹۷/۳/۳۱

وصول مقاله: ۹۷/۱/۲۱ اصلاح نهایی: ۹۷/۳/۳۰

مقدمه:

برای پر کردن با میزان کمتر دبری خروجی ایجاد می‌کنند.^(۱) خروج دبری از انتهای ریشه در حین انجام درمان ریشه سبب بروز درد و flare up پس از اتمام کار می‌شود و همچنین خروج دبری می‌تواند تا ۱۶٪ موفقیت درمان ریشه را کم کند. از آنجایی که بافت نکروتیک، باکتری‌ها و مواد شوینده، می‌توانند واکنش نامطلوبی را در ناحیه پری اپیکال ایجاد کنند، خروج این مواد می‌تواند منجر به ایجاد آسیب‌هایی چون درد پس از درمان، واکنش جسم خارجی و شکست در ترمیم ضایعه شود.^(۲) Vande و همکاران اولین کسانی بودند که میزان

معمول‌ترین وسایل مورد استفاده در درمان ریشه فایل‌های دستی stainless steel می‌باشند که به دلیل سختی زیاد و انعطاف‌پذیری کم و نوع حرکتی که با فایل انجام می‌شود غالب منجر به حوادثی نظیر شکستن فایل و خروج میزان زیاد دبری از کanal حین انجام ریشه سازی می‌گردد. برای غلبه بر این مشکل تکنیک‌های متنوع چرخشی NiTi به دلیل مزایای خاص خود راهکار نسبتاً جدیدی برای آماده‌سازی سریع و مناسب کanal به شمار می‌آیند.^(۳) تحقیقات نشان داده است که فایل‌های چرخشی NiTi به طور مؤثر کanal‌هایی با تقارب خوب

مراحل بعدی کار در سرم فیزیولوژی نگهداری شدند. ریشه مزیالی این دندان‌ها ابتدا از نظر ترک، شکستگی و پوسیدگی مورد بررسی قرار گرفت و دندان‌هایی که دارای این شرایط بودند از مطالعه حذف شدند. سپس رادیوگرافی اولیه در جهت باکولینگوالی تهیه گردید. دندان‌های با درمان قبلی ریشه، دندان‌های دارای تحلیل داخلی و خارجی در ریشه مزیال از مطالعه خارج شد. سپس حفره دسترسی دندان‌ها تهیه گردید و فایل شماره ۱۰ داخل کanal قرار گرفت تا باز بودن مسیر فورامن اپیکال کانال‌ها بررسی شود. سپس فایل ۱۵ داخل کanal قرار داده شد و عدم عبور آن از فورامن اپیکال بررسی شد. دندان‌هایی که فاقد این شرایط بودند از مطالعه خارج شدند. سپس ۲ عدد فایل ۱۰ در کanal مزیوباکال و مزیو لینگوال قرار داده شد تا با مشاهده دو عدد فورامن جدا از هم مجزا بودن کanal‌ها تایید و دندان‌هایی که دارای فورامن اپیکال مشترک بودند حذف شدند و رادیوگرافی از جهات مزیودیستالی و باکولینگوالی تهیه شد. دندان‌هایی که کanal مزیوباکال آنها حداقل در یکی از رادیوگرافی‌ها بین ۳۰ تا ۴۰ درجه بر اساس قانون اشنایدر بودند، انتخاب شدند. دندان‌های با طول‌های مشابه (۱۶ میلی‌متر) وارد مطالعه شدند، نمونه‌ها شماره‌گذاری و برای بررسی میزان دبری خارج شده از اپکس پس از آماده‌سازی از روش Montgomery و Myers استفاده شد.^(۶)

بدین صورت که ریشه مزیال از درپوش لاستیکی فلاسک‌های از قبل آماده شده عبور داده شد. در زیر این درپوش لاستیکی و در داخل فلاسک‌ها، یک ویال طوری تعییه شد که به صورت ثابت قرار گیرد. جهت تعادل فشار داخل و خارج لوله یک سوزن با گیج ۲۷ از درپوش لاستیکی عبور داده شد. (شکل ۱) این ویال‌ها از قبل شماره‌گذاری شده و توسط ترازوی دقیق (A& D, GF^{۳۰۰}) دیجیتالی با دقت ۱۰-۳ میلی‌گرم ثبت (GERMANY) شدند. (شکل ۲). سپس نمونه‌ها به دو گروه ۱۷ تایی تقسیم گردید.

دبری خارج شده حین Instrumentation را ارزیابی کردند.^(۴) مطالعه Reddy و همکاران نشان داد که میزان دبری خروجی در تکنیک‌های چرخشی، کمتر از تکنیک‌های دستی می‌باشد.^(۵)

از One-Shape(MicroMega/Besancon/France). سیستم‌های جدید فایل‌های NiTi است که با بکارگیری یک فایل و با حرکت چرخشی مداوم کanal را آماده سازی می‌کند^(۶) و^(۷) اخیراً فایلهای نوین

به Xp-endo-Shaper (FKG/La Chaux-de-Fonds/ Switzerland) بازار عرضه شده که یک ابزار شکل دهی واقع‌آورانه است و ابزار انتخابی برای درمان اکثریت قریب به اتفاق کanal هاست.^(۷,۸) تاکنون مطالعه‌ای که میزان دبری خروجی ناشی از کاربرد

فایل‌های xp-shaper (FKG/La Chaux-de-Fonds/Switzerland) با فایل‌های shape(MicroMega/Besancon/France) مقایسه کند در دسترس نمی‌باشد لذا با توجه به خلاء اطلاعاتی موجود، این مطالعه با هدف بررسی میزان دبری خروجی پس از آماده سازی کanal مزیوباکال دندان‌های مولر اول فک پایین به وسیله دو سیستم Xp-endo-Shaper و One-Shape انجام شد.

مواد و روش‌ها:

در این تحقیق که به روش تجربی- آزمایشگاهی انجام شد، تعداد ۳۴ دندان مولر اول فک پایین که دارای ویژگی‌های لازم تحقیق شامل، بدون تحلیل داخلی و خارجی و پوسیدگی و ترک و شکستگی روی سطح ریشه مزیوباکال بوده و دارای اپکس بسته با کanal مجزا و دارای انحنای ۳۰ تا ۴۰ بر اساس قانون اشنایدر^(۳) بودند، انتخاب شدند. دندان‌ها ابتدا جهت ضدغونی شدن به مدت ۱ ساعت در محلول هیپوکلریت سدیم ۵/۲۵ درصد قرار گرفتند و پس از تمیز کردن سطح ریشه‌ها از بقایای بافتی و دبری‌ها باکورت پریودنتال و گاز استریل تا

انجام شد تا کanal معادل قطر فایل شماره ۳۰ با تیپر ۶٪ گشاد سازی شود، همان طوری که ویال محتوی نمونه در محلول آب گرم قرار داده شده تا خصوصیات آلیاژ در دمای بدن بازسازی شود، با فایل شماره ۱۰ patency برقرار شد تا از پک دری در طی شکل دهی و پاکسازی کanal ریشه جلوگیری شود. بعد از هر بار ورود فایل روتاری، کanal با ۲ml آب مقطر و سپس ml ۳ هیپوکلریت سدیم ۵/۲۵ درصد توسط سرنگ شستشو با سر سوزن ۲۸ گیج (Tulsa, ok, Densply Tulsa Dental) که به صورت Passive در داخل کanal تا حداکثر ۲ میلی‌متر کوتاه‌تر از طول کارکرد قرار می‌گرفت شستشو داده شد.^(۹) طی مراحل کار دری خارج شده از اپکس وارد ویال شد. دری چسبیده به اپکس نیز پس از اتمام آماده سازی و خارج نمودن دندان از درپوش لاستیکی توسط شستشو با ml ۱ آب مقطر وارد ویال شد. فلاسک های حاوی ویال به مدت ۵ روز در انکوباتور(ساخت شرکت مهاد تهران - ایران) در دمای ۷۰ درجه سانتی گراد و سپس ۴ روز در دستگاه Desicator (Simax چک - پراغ) قرار گرفت تا آب آن تبخیر شود، بعد از خشک شدن کامل توزین مجدد هر نمونه ۳ بار انجام گرفت و میانگین اعداد هر نمونه ثبت شد(شکل ۴). نتایج تحقیق با استفاده از روش T-test با ضریب اطمینان ۹۹/۵ درصد مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.



شکل ۱- آماده سازی ویال ها به روش Myers&Montgomery

نمونه های یک گروه با سیستم چرخشی One Shape و X-Smart plus (Densply Maillifer Ballaigues, Switzerland) با تنظیم روی حرکت چرخشی کامل طبق دستور کارخانه سازنده (سرعت ۳۰۰ rpm)، گشتاور ۲/۵ (و گروه دوم با سیستم چرخشی Xp-endo-Shaper با حرکت چرخشی کامل و با همان دستگاه X-Smart plus و با تنظیم روی حرکت چرخشی کامل طبق دستور کارخانه سازنده (سرعت ۸۰۰ rpm، گشتاور ۱) آماده سازی شدند(۸).^(۸) در هر دو گروه، آماده سازی به طول یک mm کوتاه‌تر از طول کanal ها انجام شد و تمام مراحل آماده سازی توسط دانشجوی سال آخر دندانپزشکی که از پیش جهت آماده سازی کanal ها آموزش لازم را کسب نموده و تمرین ها را روی تعدادی از دندان ها انجام داده بود صورت گرفت. برای جلوگیری از دید عمل کننده در حین مراحل آماده سازی از پوشش آلومینیومی بر روی ویال شیشه ای استفاده شد.

مراحل آماده سازی کanal ها

سیستم One – Shape:

کanal ها در این گروه توسط سیستم One – Shape شماره ۲۵ با تقارب ۶ درصد با موتور مخصوص حرکت چرخشی کامل بر اساس دستور کارخانه آماده سازی شده و بعد از هر ۳ بار ورود به کanal و برخورد به ناحیه مقاوم دیواره کanal، با ۲ml آب مقطر و سپس ۳ ml هیپوکلریت سدیم ۵/۲۵ درصد توسط سرنگ شستشو با سر سوزن ۲۸ گیج (Tulsa, ok, Densply Tulsa Dental) (با انتهای بسته و سوراخ جانبی) که به صورت Passive در داخل کanal تا حداکثر ۲ میلی‌متر کوتاه‌تر از طول کارکرد قرار می‌گرفت شستشو داده شد. سپس فایل شماره ۱۰ به عنوان Patency جهت کنترل باز بودن مسیر استفاده شد.

Xp-endo-Shaper سیستم:

آماده سازی کanal ها توسط سیستم (FKG/La Chaux-de-Fonds/Switzerland)xp-endo-shaper با فایل ۳۰ و تقارب ۴٪ با گشتاور ۱ و سرعت ۸۰۰ rpm انجام شد، بعد از اینکه فایل به طول کارکرد رسید به مدت ۱ دقیقه عمل فایلینگ

آزمون T-test نشان داد میزان دبری خروجی کمتر، از لحاظ آماری معنی داربود. ($p < 0.05$)

بحث:

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که خروج اپیکالی دبری در هر دو نوع سیستم اتفاق افتاد، هر چند که سیستم Xp-endo-Shape با خروج دبری کمتری در مقایسه با سیستم One-Shape همراه می‌باشد. به طور کلی شاید بتوان گفت بنا بر یافته‌های حاصل از تحقیق، به نظر می‌رسد که با کاربرد فایل بیشتری نسبت به فایل‌های Xp-endo-Shaper خارج شد زیرا به علت انعطاف پذیری بیش از حد فایل‌های Xp-endo-Shaper، میزان درگیری این فایل‌ها با عاج کمتر بوده و منجر به خروج اپیکالی کمتر دبری و ماده شستشو دهنده می‌شوند. در مطالعه Singbal و همکارانش^(۱۶) مشابه تحقیق حاضر میزان خروجی دبری در سیستم One-Shape به طور معنی دار بیشتر از سیستم Neo-Niti که یک سیتم تک فایلی می‌باشد بوده است. در مطالعه Mittal و همکارانش^(۱۷) سیستم‌های چرخشی Pro Taper و One Shape با حرکت چرخش کامل، با خروج دبری کمتری نسبت به فایل‌های Pro Taper به علت تعداد فایل‌های بیشتر (۶ عدد) در مقایسه با سیستم تک فایلی به طور نسبی وار میزان دبری خروجی بیشتری داشت. Nayak و همکارانش^(۴) در مقایسه دو سیستم چرخشی Wave One و Reciproc با حرکت رفت و برگشتی و سیستم One shape با حرکت چرخشی کامل میزان خروج دبری را در سیستم Reciproc به طور نسبی وار بیشتر از One shape بود. آنجایی که فایل Xp-endo-Shaper محصول جدیدتری نسبت به فایل One-Shape می‌باشد، هنوز مقایله‌ای در مورد این فایل گزارش نشده است تا تأثیر آن را بر آماده سازی کانال



شکل ۲: بالانس متر دیجیتال



شکل ۳: فایل Xp-endo-Shaper، فایل One-Shape



شکل ۴: Desicator

یافته‌ها:

تحقیق روی تعداد ۳۴ نمونه و در ۲ گروه ۱۷ تایی توسط دو سیستم Xp-endo-Shaper و One-Shape انجام گرفت، میزان خروج دبری گروه One-Shape برابر با 0.014 mg بود که در گروه Xp-endo-Shaper برابر با $0.018 \pm 0.007 \text{ mg}$ بود. در گروه Xp-endo-Shaper به میزان $0.008 \pm 0.004 \text{ mg}$ درصد کمتر از روش One-Shape بود و

جهت شستشو و خروج دبری، استفاده از شستشو دهنده آنتی باکتریال مثل هیپوکلریت سدیم (NaOCl) تأکید شده است، در این مطالعه نیز از غلظت $5/25$ درصد هیپوکلریت سدیم به همراه آب مقطر برای شستشو استفاده شد. سیستم‌های روتاری باعث راحتی فرد عمل کننده و صرف زمان کمتر جهت درمان ریشه می‌شوند ولی با توجه به شکننده بودن این فایل‌ها، مقرنون به صرفه نبودن و عدم توانایی استفاده از آنها در کanal‌های با درجه انحنای خیلی زیاد و کanal‌های S-shape و کanal‌های بسیار کلسفیفه، این سیستم‌ها نمی‌توانند به طور کامل جایگزین فایل‌های دستی شوند و باید به طور ترکیبی با فایل‌های دستی استفاده شوند. نتایج این مطالعه که در شرایط آزمایشگاهی انجام شد را نمی‌توان دقیقاً به موقعیت کلینیکی و شرایط بالینی نسبت داد زیرا در شرایط کلینیکی وجود پریودنتال لیگامان مانع خروج زیاد اپیکالی دبری می‌شود. همچنین در شرایط کلینیکی امکان ارزیابی درد، التهاب و ناراحتی بیمار وجود دارد که در شرایط آزمایشگاهی مانند این تحقیق، این امکان مسیر نیست.

نتیجه‌گیری:

بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه‌گیری نمود که سیستم One-Shape به دلیل میزان بیشتر خروج دبری، در مقایسه با سیستم Xp-endo-Shaper، می‌تواند مشکلات پس از درمان بیشتری را موجب می‌شود، با این حال ارزیابی و مقایسه‌ی این دو سیستم از سایر جنبه‌ها از جمله قابلیت شکل‌دهی کanal‌ها، توانایی پاکسازی، کاهش میکروارگانیسم‌های داخل کanal پیشنهاد می‌گردد.

بررسی نماییم. در فایل One-Shape، به دلیل حرکات چرخشی کامل، سبب بهبود شکل‌دهی کanal شده و همچنین به دلیل سطح مقطع عرضی در این فایل‌ها توان برش عاج در این فایل زیاد بوده و توان خروج اپیکالی دبری بیشتری را دارا می‌باشد.

فایل Xp-endo-Shaper با حرکت چرخش کامل و با سطح مقطع غیریکسان در امتداد تیغه‌ها، فایل را قادر می‌سازد تا انعطاف‌پذیری زیادی را داشته باشد. به خاطر نوع طراحی فایل و حرکت رو به جلو در داخل کanal، تقریباً تمام دبری‌ها را به صورت تاجی خارج می‌کنند و مقدار بسیار کمی از دبری‌ها خروج اپیکالی دارند. این فایل‌ها بازدهی بالای برشی با اثر پیچشی به داخل کanal و انعطاف‌پذیری بالایی در قسمت بدن می‌باشد که اجازه ادراک لمس خوب را به عمل کننده می‌دهد. ما با انجام این تحقیق، در نظر داشتیم که بین دو سیستم تک فایل با حرکت چرخشی کامل، سیستم برتر را از نظر میزان خروج اپیکالی کمتری دبری معرفی کنیم. بنابر یافته‌های این تحقیق، در هر دو سیستم One-Shape و Xp-endo-Shaper خروج اپیکالی دبری اتفاق افتاد که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار بود و سیستم One Shape میزان خروج دبری بیشتری را نشان داد. ($P < 0.01$)

در مطالعه حاضر میزان خروج دبری از ناحیه پری اپیکال در دو سیستم One – Shape و Xp-endo-Shaper آزمایشگاهی در کanal‌های با خمیدگی $30-40$ درجه مورد بررسی قرار گرفت. در سایر تحقیقات انجام شده در این زمینه یا از کanal‌های بدون خمیدگی استفاده شده بود^(۱۹) و یا میزان خمیدگی‌ها در دامنه محدود $10-20$ درجه قرار داشت^(۱۸) در تحقیق دکتر دلورانی و همکاران^(۹) از کanal‌هایی با خمیدگی $20-35$ درجه برای بررسی خروج دبری استفاده کردند. در این تحقیق آماده‌سازی نمونه‌ها توسط دانشجوی سال آخر دندانپزشکی که از پیش جهت آماده‌سازی کanal آموزش لازم را کسب نموده و تمرین‌ها را روی تعدادی از دندان‌ها انجام داده بود صورت گرفت. در سایر تحقیقات مشابه^(۳-۲۰) نیز این امر در نظر گرفته شد. آماده‌سازی یک کanal توسط یک فایل صورت گرفت. طبق دستور کارخانه سازنده نیز هر فایل برای آماده‌سازی یک کanal در نظر گرفته شد^(۱۵-۱۱) در این تحقیق بر روی کanal مزیوباکال مولر اول فک پایین کار شد. از آنجا که

References:

1. Kuhn G, Jordan L. Fatigue and mechanical properties of nickel – titanium endodontic instruments . J Endod 2002;28(10):716-20.
2. Schafer E, Eler M, Danmaschke T. Comparative study on the shaping ability and cleaning efficiency of rotary two instruments. Part1: cleaning effectiveness and shaping ability in severely curved root canals of extracted teeth. Int Endod J 2003; 36:122-27.
3. Kocak S, Kocak MM. Saglam BC, Turker Sa, Sagsen B ,Er O. -Apical extrusion of debris using self – adjusting file, reciprocating single – file, and 2 rotary instrumentation systems.J Endod 2013 ; 39 (10): 1278-80.
4. vande vise JE, Brilliant JD. Effect of the irrigation on the production of extruded material at the root apex during instrumentation .J Endod 1975; 1:243-6.
5. Madhusudhana k, Mathew VB, Reddy NM. Apical extrusion of debris and irrigants using hand and three rotary instrumentation systems – An in vitro study. Contemp Clin Dent 2010; 1(4): 234-6.
6. Nayak G, Singh I,Shetty S, Dahiya S. Evaluation of apical extrusion of debris and irrigant using two new reciprocating and one continuous rotation single file systems . J Dent (Tehran) 2014;11(3):302-9
7. Bayram HM1, Bayram E2, Ocak M3, Uygun AD4, Celik HH3.Effect of ProTaper Gold, Self-Adjusting File, and XP-endo Shaper Instruments on Dental Microcrack Formation: A Micro-computed Tomographic Study. J Endod 2017;43(7):1166-69.
8. Available at :<http://www.fkg-ch//09/12/2017>
9. Delvarani A, Mohammad zade Akhlaghi N, Aminirad R, Tour Savadkouhi S, Vahdati SA .In vitro Comparision of Apical Debris Extrusion Using Rotary and Reciprocating System in Severely Curved Root Canals. Iran Endod j 2017;12(1):34-7
10. Schafer E,Schlingmann R.Efficacy of rotary Nickle- titanium k3 instruments compared with stainless steel hand k-flexofile. int Endod j 2003;36:208 - 17
11. Bidar M,Moradi S,Foroghani M,Bidad S,Azghadi M,Rezvani S,khoynezhad S.Microscopic evaluation of cleaning efficiency of three different Nickle- titanium rotary instrument. Iran Endod J 2010 1;5(4):174-8
- 12.Tinaz Ac,Alacam T,Vznu O,Maden M,kayaoglu G . The effect of disruption of apical constriction on periapical extrusion. J Ended 2005;31(7):533-5
- 13.Aminsobhani M , Meraji N, KHoshdel A, GHorbanzade A. The effect of root canal preparation using single versus multiple endodontic rotary files on post-operative pain, a randomised clinical trial. Eur Endod J 2017; 2:23
- 14.Gambarini G, Di Nardo D, Miccoli G, Guerra F, Di Giorgio R, Di Giorgio G,etal.The Influence of a New Clinical Motion for Endodontic Instruments on the Incidence of Postoperative Pain Clin Ter 2017;168(1): 23-7
- 15.SHokrane A, Ajami M,Farhadi N,Hosseini M. Postoperative endodontic pain of three different instrumentation techniques in asymptomatic necrotic mandibular molars with periapical lesion: a prospective, randomized, double-blind clinical trial . January 2017; 21(1): 413–8
- 16.Singbal k,Disha jain,Kranthi Raja. Comparative evaluation of apically extruded debris during root canal instrumentation using two Ni-Ti single file rotary system:An In vitro study. J conserve Dent 2017 ;20(2):64-7.
- 17.Mittal R,Singla MG, Garg A. Acomparison of apical bacterial extrusion in manual, Pro Taper Rotary and One shape Rotary instrumentation techniques. J Endod 2015 ;41(12):2040-4
- 18.Logani A,Shah N. Apically extruded debrise with three contemporary Ni-Ti instrumentation system. Indian J Dent Res 2008;19(3):182-5
- 19.Tambe VH, Nagmode PS, Vishwas JR,P SK, Angadi P, Ali FM. Evaluation of the amount of debris extruded apically by using conv-entional Syringe, Endovac and Ultrasonic Irrigation Technique: An In Vitro Study. J Int Oral Health 2013;5(3):63-6.
- 20.Bürklein S, Benten S, Schäfer E.Quantitative evaluation of apically extruded debris with differentsingle_file systems:Reciproc ,F360, and One shape versus Mtwo. Int Endod J 2014; 47(5):405-9