

بررسی شیوع ضایعات سفید دندانی در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به دو بخش آموزشی شهر تهران

دکتر فرامرز مجتهد زاده^۱ دکتر هاله حشمت^{۲*} دکتر احمد شیبانی نیا^۳ دکتر محمد جواد خرازی فرد^۴ دکتر طلیعه محمودهاشمی^۵
دکتر الهام مروج صالحی^۶

۱- استادیار بخش ارتودنسی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲- استادیار بخش ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی تهران

۳- استادیار بخش ارتودنسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی تهران

۴- دندانپزشک و متخصص آمار و عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۵- دندانپزشک

۶- دستیار تخصصی دندانپزشکی ترمیمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دندانپزشکی تهران

خلاصه:

سابقه و هدف: بروز ضایعات سفید دندانی، در افراد تحت درمان ارتودنسی به علت تغییر اکولوژی دهان، از ریسک بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت پیشگیری، تحقیق حاضر برای بررسی شیوع این ضایعات در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت و نیز تأثیر عوامل مختلف بر آن طراحی شد.

مواد و روش‌ها: مطالعه توصیفی واز نوع مقطعی می‌باشد. نمونه‌های مورد بررسی شامل، ۲۰۰ نفر و سطح باکال دندان‌های اینسایزور، کانین و پره مولرهای فک بالا و پایین مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه شامل سن و جنس بیماران، تحصیلات والدین آنها و نیز تعداد دفعات مسواک زدن در طول شبانه روز، روش مسواک زدن و نوع مسواک مورد استفاده آنها، طول مدت درمان، استفاده یا عدم استفاده از نخ دندان، استفاده یا عدم استفاده از دهانشویه فلوراید در طول درمان، توسط معاینه گر تکمیل شده و سپس دندانها معاینه و فراوانی ضایعات سفید دندانی به صورت درصد بیان گردیدند. نقش عوامل مرتبط با آزمون **Binary Logistic Regression** بررسی شد.

یافته‌ها: در ۹۰/۵ درصد نمونه‌ها حداقل یک دندان دارای ضایعه سفید بود. بیشترین شیوع در فک بالا، دندان لترال و در فک پایین، پره مولر اول بود. مدت درمان، تأثیر مثبت بر شیوع ضایعات داشت. ($P < 0/0001$) استفاده از فلوراید در طول زمان و تعداد دفعات مسواک زدن در شبانه روز، باعث کاهش معنی‌داری ضایعات شده بود. ($P = 0/008$) و ($P = 0/003$) نوع مسواک و استفاده از نخ دندان و سن و جنس بیماران تأثیر معناداری در شیوع ضایعات نداشت. در بیماران با والدین دارای تحصیلات بالاتر شیوع ضایعات سفید دندانی بیشتر بود ($P < 0/006$).

نتیجه‌گیری: شیوع ضایعات سفید در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت قابل توجه است. عواملی نظیر استفاده از دهان‌شویه‌های حاوی فلوراید و افزایش دفعات مسواک زدن در شبانه روز در کاهش این ضایعات تأثیر معنی‌داری دارد.

کلید واژه‌ها: ضایعات سفید دندانی، پوسیدگی، دندانی، ارتودنسی، بهداشت دهان

وصول مقاله: ۹۰/۱۰/۱۶ اصلاح نهایی: ۹۰/۱۲/۲۳ پذیرش مقاله: ۹۱/۲/۲۷

مقدمه:

در حد مینا است، که در نتیجه این پدیده، لکه سفید و گچی روی سطح دندان آشکار می‌شود.^(۱) امکان بروز ضایعات سفید در بیماران با شرایط خاص، مانند بیماران ارتودنسی افزایش می‌یابد.^(۱) وجود اپلاینس ها و براکت‌های ارتودنسی، اکولوژی دهان را تغییر می‌دهد و به دنبال آن با ایجاد مشکل در رعایت

پوسیدگی دندانی یکی از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی در سطح جوامع بشری است.^(۱) پوسیدگی اولیه یا ضایعات سفید، مرحله ابتدایی دمیترالیزاسیون یا دکلسیفیکاسیون بافت دندان

نویسنده مسئول مکاتبات: دکتر هاله حشمت، استادیار بخش ترمیمی، خیابان پاسداران، نیستان دهم، واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، بخش ترمیمی تلفن: ۰۹۱۲۲۰۲۷۶۸۸

Email: h_heshmat@yahoo.com

مورد بحث محققین است. این مشکل باید در درمان‌های مدرن ارتودنسی با توجه به عوامل دیگری مانند فلورایدتراپی، آموزش صحیح رعایت بهداشت و بسیاری از عوامل مستعد کننده پوسیدگی در بیماران ارزیابی شود.^(۸)

با توجه به اهمیت موضوع و توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه، تحقیق حاضر، با عنوان بررسی شیوع ضایعات سفید دندانی در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت و عوامل مرتبط با آن در مراجعین به دو بخش آموزشی شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۹۰ انجام شد.

مواد و روش‌ها:

این تحقیق از نوع توصیفی-مقطعی است. نمونه‌گیری به روش مراجعه مستمر انجام شد تا به تعداد مقرر ۲۰۰ نفر رسید. افرادی که در دو مرکز درمانی-آموزشی (دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران) تحت درمان ارتودنسی قرار گرفته بودند، به صورت تصادفی انتخاب شده و چنانچه سن بالای ۱۲ سال داشتند و بیش از ۶ ماه تحت درمان ارتودنسی ثابت قرار گرفته بودند به عنوان نمونه بررسی شدند. در ضمن همه بیماران دارای دندان‌های اینسایزور، کانین و پره مولر فک بالا و پایین به صورت کامل بودند. همه بیماران در دوره دندانی دائمی بودند. در غیر اینصورت از مطالعه حذف می‌شدند. اطلاعات مربوط به سن، جنس، میزان تحصیلات والدین، تعداد دفعات مسواک زدن در شبانه روز، استفاده از فلوراید در طول درمان و مدت تحت درمان توسط معاینه‌گر پرسش و در فرم اطلاعاتی ثبت شد. سطوح باکال دندان‌های اینسایزور، کانین و پره مولر فک بالا و پایین کاملاً خشک و ایزوله شده و در زیر نور یونیت دندانپزشکی توسط انترن دندانپزشکی که قبلاً آموزش‌های لازم را در جهت تشخیص کلینیکی ضایعات سفید دندانی دیده و در مطالعه آزمایشی صلاحیت لازم را برای انجام این مهم بدست آورده بود مورد معاینه قرار گرفت و کنترل نهایی توسط استاد راهنما انجام شد. معاینه با آینه دندانپزشکی بدون استفاده از سوند و بدون نیاز به عکس رادیوگرافی انجام گرفت. سطوح

بهداشت، تجمع پلاک در اطراف براکتها افزایش می‌یابد.^(۳-۵) پلاک اطراف براکتها در حضور ساکارز، اسیدهای آلی ترشح می‌کنند، که باعث حل شدن یون‌های کلسیم و فسفات سطح مینا می‌شوند و دمینرالیزاسیون مینا بیشتر اتفاق می‌افتد.^(۶) این پدیده منجر به ایجاد ضایعه سفید در اطراف براکت و سطح باکال دندان‌ها در عرض ۴ هفته می‌شود.^(۶،۳) عنوان شده است که ۳۰٪ ضایعات در سطح باکال ایجاد شده و فراوانی آن در مردان ۴۰٪ و در زنان ۳۰٪ است. شیوع ضایعات سفید در بیماران با درمان ارتودنسی ثابت بین ۲٪ الی ۹۶٪ گزارش شده است.^(۷)


Wisith افراد تحت درمان ارتودنسی را به مدت ۱/۵ تا ۲ سال بعد از اتمام درمان مورد مطالعه قرار داد. در این تحقیق ثابت شد که افراد تحت درمان ارتودنسی میزان پوسیدگی بیشتری نسبت به گروه شاهد دارند.^(۸)

Schagenhau و همکارانش تأثیر درمان‌های ارتودنسی را بر شاخص‌های ریسک پوسیدگی بررسی نمودند. در این پژوهش بزاق کودکان دارای اپلاینس‌های ارتودنسی ثابت نسبت به کودکان بدون اپلاینس و کودکان دارای اپلاینس متحرک دارای میزان بیشتری از استرپتوکوک موتانس بود و در واقع بیشترین میزان خطر آلودگی میکروبی را دارا بودند.^(۹)


Lourov و همکاران در تحقیقی میزان دمینرالیزه شدن مینای دندانی طی درمان‌های ارتودنسی ثابت و ارتباط آن را با شاخص‌های بهداشت دهان به شیوع این ضایعات را ارزیابی کردند.^(۱۰) ۹۷/۵٪ دندانها قبل از درمان و ۷۳/۶٪ از آنها بعد از درمان بدون ضایعات سفید تشخیص داده شدند و ۲۴/۹٪ تشکیل ضایعات جدید گزارش شده که این ضایعات بیشتر در پرمولرهای بالا و پایین دیده شد. شیوع ضایعات با بهداشت دهان و میزان استفاده از فلوراید ارتباط معنادار داشت. و اعلام شد که حتماً در مورد بیماران تحت درمان برای جلوگیری از ایجاد ضایعه سفید باید تمهیدات لازم برای آموزش بهداشت و افزایش میزان استفاده از فلوراید انجام پذیرد.

البته پاسخ به این پرسش که آیا درمان ارتودنسی به تنهایی تأثیر شاخصی برافزایش فعالیت پوسیدگی می‌گذارد و یا نه


ضایعه سفید را داشته است. کمترین شیوع نیز در هر دو فک مربوط به مولرهای اول و دوم می باشد. در ضمن بین قسمت راست و چپ فک بالا و قسمت راست و چپ فک پایین بیمار از لحاظ آماری تفاوتی در بروز ضایعه سفید مشاهده نشده است.



نمودار ۱- میزان ضایعات سفید در دندانهای سمت راست فک بالا



نمودار ۲- میزان ضایعات سفید در دندانهای سمت راست فک پایین



نمودار ۳- میزان ضایعات سفید در دندانهای سمت چپ فک بالا



نمودار ۴- میزان ضایعات سفید در دندانهای سمت چپ فک پایین

با استفاده از آنالیز آماری **Binary Logistic Regression** اثر عوامل مورد نظر در تعداد ضایعات سفید مشخص شد: سن و جنس بیماران در میزان بروز ضایعات سفید به شرح زیر تأثیر معناداری نداشت. در حالیکه فلوراید تراپی در طول درمان اثر معناداری بر کمتر شدن ضایعه سفید داشت و می تواند

دندانها به طور مجزا به دقت مورد بررسی قرار گرفت. و لکه‌های سفید به عنوان ضایعه سفید تلقی شدند. این لکه‌ها در حضور رطوبت قابل مشاهده نمی‌باشند. (۵،۱۱) شماره دندان و سطح درگیر در فرم اطلاعاتی ثبت گردید. برای بررسی میزان رعایت بهداشت، پلاک ایندکس بیماران با استفاده از قرص نمایانگرپلاک با نام تجاری Dimethicon اندازه‌گیری شد. (۴) در خاتمه تحقیق میزان شیوع ضایعات سفید در نمونه‌ها بررسی شده و نقش عوامل مرتبط با آن تعیین گردید. یافته‌ها با آزمون Binary Logistic Regression مورد قضاوت آماری قرار گرفتند.

یافته‌ها:

تحقیق بر روی ۲۰۰ بیمار تحت درمان واجد شرایط انجام گرفت. تعداد ۱۳۴ زن (۶۷٪) و ۶۶ مرد (۳۳٪) مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس این تحقیق در ۹۰/۵٪ نمونه‌ها حداقل ۱ دندان دارای ضایعه سفید مشاهده گردید.

۳٪ افراد یک روز در میان مسواک می‌زدند، در حالیکه ۳۱٪ افراد روزی یک مرتبه، و ۳۳/۵ درصد نیز روزی ۲ بار مسواک می‌زدند. ۳۰٪ روزی ۳ بار مسواک می‌زدند و تنها ۲/۵٪ روزی ۴ بار از مسواک استفاده می‌کردند.

در میان افراد مورد مطالعه ۳۰٪ افراد از مسواک‌های معمولی و ۷۰٪ از مسواک‌های مخصوص ارتودنسی استفاده می‌کردند. تعداد ۱۶۸ نفر (۸۴٪) از مسواک بین دندانی استفاده می‌کردند. اما تنها ۲۹ نفر یعنی (۱۴/۵٪) از کل نمونه‌ها از نخ دندان‌های موجود برای افراد تحت درمان‌های ارتودنسی استفاده می‌کردند و نزدیک به ۲۰٪ افراد در طول درمان تحت فلوراید تراپی قرار داشتند.

در نمودارهای ۱ تا ۴ تشخیص ضایعه سفید را در دندانهای هر ربع فک مقایسه شده است و نشان می‌دهد در سمت راست و نیز چپ در دندانهای فک بالا، بیشترین تعداد تشخیص ضایعات سفید در دندان لترال بوده است. در حالیکه در سمت راست دندان‌های فک پایین دندان پره مولر اول بیشترین تعداد را دارا بوده است و در سمت چپ، دندان کانین بیشترین شیوع

را از ۲ الی ۹۶ در صد گزارش نمودند.^(۱۲) Boersma و همکارانش شیوع ضایعات سفید را در بیماران ارتودنسی ۹۶٪ گزارش نموده‌اند.^(۵) گزارش ما نزدیک به نتایج تحقیق ایشان می‌باشد. اما باید به نتایج پراکنده و متفاوت دیگر گزارشات نیز توجه نمود. از آنجا که پوسیدگی یک بیماری با عوامل متعددی مانند روش تغذیه، موقعیت اجتماعی، زمینه ژنتیکی و بهداشت فردی و سایر موارد است، بنابراین انتظار خواهیم داشت که در موقعیت‌ها و مکان‌های مختلف به نتایج متفاوتی دست یابیم.

برای بررسی دقیق‌تر میزان شیوع پوسیدگی و تعیین خطر ابتلا به پوسیدگی در بیماران، پژوهشگران لازم دانستند علاوه بر آنکه DMF را مورد ارزیابی قرار می‌دهند (که همان تعداد دندان‌های پوسیده دارای حفره، ترمیم شده و از دست رفته است)، به وجود پوسیدگی‌های بدون حفره و در حد مینا، که نشانی از شروع پوسیدگی است توجه نمایند. بر این مینا وجود پوسیدگی را بر D1, D2, D3 و D4 ارزیابی می‌نمایند. D1 تعیین پوسیدگی‌هایی است در حد مینا که دارای حفره نیست و در واقع همان ضایعات سفیدی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یک مزیت اصلی تعیین پوسیدگی بدون حفره اولیه و این طبقه‌بندی، ارزیابی نمای کلی ریسک ابتلا و پیشرفت پوسیدگی در یک فرد و در جامعه است. به عبارت دیگر تشخیص پوسیدگی‌های اولیه، مؤکد فلسفه درمان‌های غیر تهاجمی و کنترل و پیشگیری از پوسیدگی‌های وسیع‌تر به ویژه در بیماران با خطر بالای پوسیدگی می‌باشد.^(۱۱)

در این پژوهش بیشترین شیوع پوسیدگی در دندان لترال فک بالا و دندان‌های ۳ و ۴ فک پائین دیده شد. Lourov و همکارانش نیز در پژوهش خود، علاوه بر آنکه افزایش خطر پوسیدگی را در بیماران ارتودنسی ثابت ۲۵٪ نشان دادند، بیشترین شیوع پوسیدگی را در دندان‌های ۴ و ۵ بالا گزارش کرده‌اند و دندان لترال بالا در مقام دوم قرار گرفته بود.^(۱۰) در هر دو این تحقیقات کمترین شیوع پوسیدگی را مربوط به مولرها دانستند. Bjorn و همکارانش شیوع کمتر پوسیدگی را در دندان‌های مولر به این موضوع مرتبط می‌دانند که وجود

حدود ۱/۳ درصد از تعداد دندان‌های دچار این ضایعات را بکاهد ($P=0/008$).

تأثیر نوع مسواک مورد استفاده و نیز استفاده کردن از نخ دندان ارتودنسی در کاهش شیوع ضایعات سفید در تحقیق ما ثابت نشد. استفاده از مسواک‌های بین‌دندانی نیز در شیوع ضایعه سفید تأثیر معناداری نداشت ($P=0/957$).

طول درمان ارتودنسی تأثیر شاخصی در شیوع ضایعات سفید دندان‌ها داشت ($P<0/001$) به نحوی که در ازای هر یک ماه افزودن به مدت درمان، تعداد ضایعات سفید ۰/۰۷ درصد بیشتر شد.

تعداد دفعات مسواک زدن در شبانه روز نیز در شیوع ضایعات سفید تأثیر معنی‌داری داشت ($P<0/003$) می‌گذارد. یعنی هر تعداد که به دفعات مسواک زدن افزوده شده است، حدود ۰/۰۶ از شیوع ضایعات سفید کاسته شد. از بین کسانی که ضایعات سفید دندان‌ها داشتند تعداد ۱۳۸ نفر تحصیلات والدین‌شان دیپلم و کمتر از آن بود یعنی (۶۰٪) و تعداد ۶۲ نفر یعنی (۳۱٪) تحصیلات والدین‌شان شامل تحصیلات دانشگاهی می‌شد.

بیمارانی که والدین‌شان تحصیلات دانشگاهی داشتند نسبت به افرادی که تحصیلات والدین آنها دیپلم و کمتر بود، شیوع بیشتر نشان دادند ($P<0/006$) و نیز در مورد پلاک ایندکس، به ازای هر ۰/۱ اضافه شدن بر سطوح دارای پلاک دندان‌ها، ۰/۰۸ درصد به شیوع ضایعه سفید اضافه شد.

بحث:

در این پژوهش به بررسی میزان شیوع ضایعات سفید در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت پرداختیم و شیوع ضایعات سفید در اطراف براکت‌های ارتودنسی در سطح باکال دندانها ۹۰/۵٪ برآورد گردید. در میزان شیوع ضایعات سفید، فلوراید تراپی در طول درمان، تعداد دفعات مسواک زدن، پلاک ایندکس، طول مدت درمان و میزان تحصیلات پدر و مادر بیماران از جمله عوامل موثر در این مطالعه ارزیابی شدند.

در سال ۱۹۹۲ دکلسیفیکاسیون در اطراف براکت‌های ارتودنسی

Band به ویژه در مولر اول، دارای ویژگی محافظت کننده روی سطح باکال و پروگزیمال دندانها دارد، در حالیکه سطح باکال و لینگوال دندانهای اینسایزور و پرمولرها با وجود برکتها بیشتر مستعد تجمع پلاک میکروبی و در نهایت پوسیدگی هستند.^(۱۳)

البته Wisith و همکارانش در سال ۱۹۷۷ بیشترین شیوع پوسیدگی را در دندانهای مولر اول و پره مولر و کانین و سانتال در هر دو فک مشاهده نمودند و شیوع پوسیدگی را در ۱/۵ الی ۲ سال بعد در بیماران تحت درمان ارتودنسی کمتر از بیماران گروه کنترل نشان دادند و نتیجه گرفتند عوامل مهمتری مانند معاینه ۶ ماه یکبار دندانها و دستورات بهداشتی به صورت منظم و پیگیری بیمار از عوامل مؤثر در کاهش پوسیدگی است. بنابراین درمان ثابت ارتودنسی، بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر نمی تواند عامل مؤثر غالب در ایجاد پوسیدگی باشد.^(۸)

لازم به ذکر است در تحقیق مذکور DMF بدون توجه به ضایعات سفید و بدون حفره اندازه گیری شده است و چنین انتظاری نداریم که در طول درمان ارتودنسی تعداد ترمیمها، دندانهای از دست رفته و پوسیدگی دچار تغییر شاخصی گردد. همسو با پژوهش مذکور، در تحقیق ما نیز استفاده از دهانشویه فلوراید بعنوان عاملی در جهت کاهش ایجاد ضایعه سفید عمل کرده و استفاده از دهانشویه فلوراید به میزان ۱/۳ درصد از دندانهای دارای ضایعه سفید بکاهد. چنانچه Sudjalim نیز استفاده از محلول سدیم فلوراید در طول درمانهای ارتودنسی را در کاهش دمینرالیزاسیون مینا در تحقیق خود به اثبات رسانده است.^(۷)

عامل دیگری که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است، میزان تحصیلات والدین بیماران می باشد. در بسیاری از منابع مرتبط با پوسیدگی دندانی، تحصیلات والدین در افراد جوان و بچهها از عوامل مهم و مثبت در کنترل خطر پوسیدگی دندانها گزارش شده است. اگرچه سایر مطالعات این عامل را در میان عوامل دیگر برجسته نمی داند.^(۱۱)

جالب توجه است که در پژوهش حاضر این رابطه معکوس بوده

و هر چه سطح تحصیلات والدین بالاتر رفته است، میزان پوسیدگیهای اولیه در افراد بیشتر بوده است. با نگرش اپیدمیولوژی و جامعه نگری، شیوع پوسیدگی در جامعه، قطبی است. بدین معنی که درصد بیشتر پوسیدگی در سطح جامعه، شهر، کشور و جهان به افرادی با سطح زندگی پایین تر و موقعیت اجتماعی نامطلوب تر تعلق می گیرد.^(۱) اما لازم به ذکر است که از دیگر عوامل بسیار مهم در ریسک پوسیدگی، الگوی تغذیه می باشد.^(۱۳، ۲۰، ۳۰، ۱۴، ۱۳) اگرچه این پژوهش مستقیماً اثر تغذیه را بر میزان پوسیدگی ارزیابی ننموده است، اما میزان تحصیلات والدین می تواند مرتبط با وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد باشد.^(۱۳، ۱) هر چه وضعیت اقتصادی بهتر باشد مصرف میان وعده و انواع ساکارز رو به افزایش و در نتیجه شیوع پوسیدگی بالا می رود. افزایش پوسیدگی در اثر مصرف انواع ساکارز و تنوع در شکل مواد غذایی در کشورهای پیشرفته مانند امریکا تا قبل از اضافه شدن فلوراید به آب آشامیدنی کاملاً مشهود بوده است.^(۱)

پر واضح است که رعایت بهداشت، از لحاظ تعداد دفعات مسواک زدن عامل مؤثری در کاهش پوسیدگی در طول درمان است^(۱۰، ۲۰، ۱۱، ۱۵). پلاک ایندکس نشانگر پلاکهای میکروبی باقیمانده روی سطوح دندانی است.^(۱۶) در تحقیق حاضر نیز به وضوح دیده شده که تعداد دفعات مسواک زدن بیشتر و پلاک ایندکس کمتر می تواند در کاهش ایجاد ضایعات سفید مؤثر باشد.

بین استفاده از نخ دندان و روش مسواک زدن و شیوع ضایعه سفید رابطه آماری مشخصی مشاهده نگردید. در ضمن بین قسمت راست و چپ فک بالا و قسمت راست و چپ فک پایین بیمار از لحاظ آماری تفاوتی در بروز ضایعه سفید مشاهده نشده است و این خود نشانگر عدم ارتباط بین دسترسی بیمار و روش مسواک زدن با بروز پوسیدگی است. نخ دندان می تواند در پیشگیری از پوسیدگیهای پروگزیمال بسیار مؤثرتر باشد، تا سطح باکال دندانها و به منظور بررسی پوسیدگیهای اولیه در سطوح پروگزیمال نیاز بود پس از اتمام درمان ارتودنسی و باز شدن اپلاینسها از رادیوگرافی و روشهای جدیدتر و دقیق تر

ارتودنسی (بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر) بر ایجاد ضایعات سفید باشد. لازم به ذکر است برای بررسی دقیقتر ارتباط درمان ارتودنسی و پوسیدگی، میزان پوسیدگی قبل و پس از درمان باید ارزیابی گردد، که البته در این مطالعه شیوع یا فراوانی پوسیدگی بررسی شده است.

نتیجه گیری:

بر مبنای این تحقیق، شیوع ضایعات سفید در بیماران تحت درمان ارتودنسی ثابت قابل توجه می باشد و عواملی نظیر تعداد دفعات مسواک زدن در روز، میزان تحصیلات و موقعیت اجتماعی والدین، استفاده از دهانشویه فلوراید و مدت درمان ارتودنسی در بروز این ضایعات تأثیر شاخصی دارد. بنا براین با توجه به نتایج این تحقیق و به منظور پیشگیری از بروز ضایعات سفید در بیماران تحت درمان ارتودنسی لازم است قبل از شروع درمان و در طی آن نکاتی را مانند تأکید بر مسواک زدن با روش درست، استفاده از دهانشویه، بهبود الگوی تغذیه را مورد توجه قرار داد و دستورات لازم را به بیماران ابلاغ نمود.

تشخیص پوسیدگی مانند دیاگنودنت استفاده نمائیم. که البته از کاستی‌های این پژوهش بوده و نیاز به تحقیقات آتی کامل تری را نشان می‌دهد.

طبق پژوهش‌های بسیاری از محققین، بیماران ارتودنسی دارای اپلاینس‌های ثابت، به علت تغییر اکولوژی دهان و تجمع پلاک میکروبی در اطراف براکتها که رعایت بهداشت آن، به مراتب مشکل‌تر از حالت عادی است. در دسته بندی بیماران با خطر متوسط تا بالای ابتلا به پوسیدگی قرار می‌گیرند.^(۵،۴،۱۱،۱۷،۱۸) اما از آنجا که پوسیدگی یک بیماری با عوامل مرتبط متعدد است، نمی‌توان شیوع پوسیدگی و ضایعات سفید را منحصرأ به وجود براکتها و درمان ارتودنسی نسبت داد و برای اثبات اثر طول درمان ارتودنسی به تنهایی لازم است، پوسیدگی بیماران قبل از شروع درمان ارزیابی و حداقل ۶ ماه پس از درمان مقایسه شود. اگرچه در برخی مقالات هیچ ارتباطی بین مدت زمان درمان ارتودنسی و پوسیدگی بیمار مشاهده نمودند.^(۱۲،۱۵) اما از آنجا که در پژوهش ما زمان سپری شده از آغاز درمان بیمار اثر شاخصی بر درصد ضایعات سفید داشته است، این ارتباط، می‌تواند نشانگر اثر درمان

References:

- 1-Theodore M, Roberson, Harald O, Heyman, Edward J. Swift, Jr : Art and Science of Operative Dentistry. 5th. Mosby. St. Louis, 2006; ch: 3, 65-134.
- 2-James B. Summitt, William Robbins, Richard Shwartz: Fundamentals of Operative Dentistry. 3rd. Quintessence. Carol Stream. 2006; ch: 3, 51-66.
- 3-Chin MY, Sandham A, Rumachik EN, Ruben JL, Huysmans MC. Fluoride Release and Cariostatic Potential of Orthodontic Adhesives With and Without Daily Fluoride Rinsing. Am J orthodDentofacialOrthop. 2009Oct; 136(4): 547-53.
- 4-Paschos E, Kleinschrodt T, Clementino-Luedemann T, Huth KC, Hickel R, Kunzelmann KH, et al. Effect of Different Bonding agent on Prevention of Enamel Demineralization Around Orthodontic Brackets. Am J OrthodDentofacialorthop. 2009May; 135(5): 603-12.
- 5-Boersma JG, Vanderveen M.H, Langerweij MD, Bokhout B, Prahl-Andersen B. Caries Prevalence Measured With QLF After Treatment with Fixed Orthodontic Appliance Influencing Factors. Caries Res. 2005 Jan-Feb; 39(1): 41-7
- 6-Ghiz MA, Ngan P, Kao E, Martin C, Gunel E. Effect of Sealant & Self Etching Primer on Enamel Decalcification, Part II An in-vivo study. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2009 Feb; 135(2): 206-13
- 7-Sudjalim TR, Woods MG, Manton DJ, Reynolds EC. Prevention of Demineralization Around Orthodontic Brackets Invitro. Am J OrthodDentofacialOrthop. 2007 Jun; 131(6): 705.e1-9.
- 8-Wisith PJ, Nord A. Caries Experience in Orthodontically Treated Individuals. Angle Orthod. 1977 Jan; 47(1): 59-64.

- 9-Schlagenhauf U, Tobien P, Engelfried P. Effects of Orthodontic Treatment on Individual Caries Risk Parameters. *DtschZahnarztl*. 1989Oct; 44(10): 158-60.
- 10-Lourov S, Hertrich K, Hirschfelder U. Enamel Demineralization During Fixed Orthodontic Treatment- Incidence and Correlation to Various oral – Hygiene Parameters. *J Orofacorthop*. 2007 Sep; 68(5): 353-63.
- 11- Edwina K. Dental Caries. 2nd. Blackwell Munksgaard. Oxford. 2008; ch:9 147-60, 479-82.
- 12-Southard TE, Cohen ME, Ralls SA, Rouse LA. Effects of Fixed Appliance Orthodontic Treatment on DMF Indices. *Am J orthodDentofacialortho P*. 1986Aug; 90(20):122-6
- 13-Bjorn U, Sigrun R. Caries Incidence & Orthodontic Treatment With Fixed Appliance. *Oral Science*. 1971Apr; 79(2):183-192
- 14-Powell LV. Caries Risk Assessment: Relevance to the Practitioner. *J Am Dent Assoc*. 1998 Mar; 129(3):349-53.
- 15-Ulukapi H, Koray F, Efes B. Monitoring the Caries Risk of Orthodontic Patients. *Quintessence Int*. 1997 Jan; 28(1):27-9.
- 16-Al Mulla AH, Kharsa SA, Kjellberg H, Birkhed D. Caries Risk Profiles in Orthodontic Patients at Follow – Up Using Cariogam. *Angle Orthod*. 2009 Mar; 79(2):323-30
- 17-Van Beek H. Risk of Orthodontic Treatment. *Ned Tijdschr Tandheelkd*. 2009 Jun; 116(6):306-10. Review
- 18-Sagarika N, Suchindran S, Loganathan S, Gopikrishna V. Prevalence of White Spot Lesion in A Section of Indian Population Undergoing Fixed Orthodontic Treatment: An in Vivo Assessment Using the Visual International Caries Detection and Assessment System II Criteria. *J Conserv Dent*. 2012 Apr; 15(2):104-8.

